

1. Izračunaj spodnje determinante

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{vmatrix},$$

$$(c) \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix},$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix},$$

$$(d) \begin{vmatrix} -4 & 3 & 2 & -2 \\ 5 & -1 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & -4 & -5 \\ -5 & 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}.$$

Rešitev: (a) 1, (b) 2, (c) 14, (d) 216.

2. Za katere vrednosti parametrov x oziroma a spodnji matriki *nimata* inverza?

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ x^3 & x & 0 & x^2 \\ 0 & 0 & x-1 & 0 \\ -1 & 0 & -3 & x+1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} -1 & a & a^2-1 & 1 \\ 0 & a & -1 & 1 \\ -1 & -a & 1-a^2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Rešitev: (a) $x = -1, 0, 1$, (b) $a = 0$.

3. Izračunaj spodnje determinante ali pa vsaj poišči rekurzivno zvezo, ki jih izraža.

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Rešitev: Označimo z d_n determinanto $n \times n$ matrike take oblike.

Tedaj je: (a) $d_n = d_{n-1} - d_{n-2}$, kjer $d_1 = 1$ in $d_2 = 0$, (b) $d_n = 2 - n$.

4. Iz matrik $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sestavimo $2n \times 2n$ bločno matriko

$$\begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix}.$$

Prepričaj se, da velja formula

$$\det \left(\begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix} \right) = \det(A+B) \cdot \det(A-B).$$

Ali je ta determinanta enaka $\det(A^2 - B^2)$? Utemelji ali pa poišči protiprimer!

Rešitev: V splošnem $\det \left(\begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix} \right)$ ni enako $\det(A^2 - B^2)$, za npr. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ in $B = A^T$ ne velja.

5. Dani sta matriki

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{in} \quad T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Izračunaj determinante matrik S , T , ST , ST^{-1} ter $(S - T)^{-1}$.

Rešitev: $\det(S) = 8$, $\det(T) = 8$, $\det(ST) = 64$, $\det(ST^{-1}) = 1$, $\det((S - T)^{-1}) = 1$.

6. Naj bosta \mathbf{x} in \mathbf{y} poljubna vektorja iz \mathbb{R}^n .

(a) Izrazi determinanto matrike

$$\begin{bmatrix} 1 & -\mathbf{y}^\top \\ \mathbf{x} & I \end{bmatrix}$$

z enostavno formulo \mathbf{x} in \mathbf{y} .

Namig: Naredi 'bločno Gaussovo eliminacijo' na prvem stolpcu matrike A .

(b) Kako bi izračunal $\det(I + \mathbf{x}\mathbf{y}^\top)$? Koliko je $\det(I + \mathbf{x}\mathbf{y}^\top)$, če sta \mathbf{x} in \mathbf{y} pravokotna vektorja?

Rešitev: (b) $\det(I + \mathbf{x}\mathbf{y}^\top) = 1 + \mathbf{y}^\top \mathbf{x}$, če $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ je torej $\det(I + \mathbf{x}\mathbf{y}^\top) = 1$.