

Diskretne strukture

Gašper Fijavž

Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani

28. oktober 2022

Predikatni račun

Predpostavki: *Vsi študentje računalništva znajo logično sklepati.*
Škrat Kuzma ne zna logično sklepati.

Zaključek: *Škrat Kuzma ni študent računalništva.*

Področje pogovora in predikati

Področje pogovora je neprazna *množica* iz katere izbiramo *individualne konstante*.

Predikati so logične *funkcije*, ki za svoje argumente lahko dobijo individualne konstante iz področja pogovora.

Če v predikate vstavljamo (individualne) konstante, dobimo *izjave*.

Spremenljivke in formule

V predikatnem računu bomo za spremenljivke uporabljali črke x, y, z, \dots

V predikate lahko, namesto konstant, vstavljamo tudi spremenljivke. Na ta način pridelamo *formule*. Formule niso nujno izjave.

Kvantifikatorja

Poznamo dva kvantifikatorja:

\forall univerzalni kvantifikator

\exists eksistenčni kvantifikator

formalizacija

Definiraj ustrezne predikate in zapiši naslednje izjave:

- ▶ *Nekateri politiki so nepošteni.*
- ▶ *Noben politik ni nepošten.*
- ▶ *Vsi politiki so nepošteni.*
- ▶ *Vsi politiki so pošteni.*

Kako iz formule naredimo izjavo?

Možna sta dva pristopa.

1. Namesto spremenljivke vstavimo konstanto.
2. Formulo zapremo s kvantifikatorji.

Zgled

Dvomestni predikat $P(x, y)$ naj pomeni x pozna y -ona.

Na katere načine lahko formulo $P(x, y)$ spremeniš v izjavo?

Izjavne formule

- ▶ *spremenljivke* x, y, z, \dots ,
- ▶ *konstante* a, b, c, \dots ,
- ▶ *predikati* P, Q, R, \dots ,
- ▶ izjavni vezniki $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \dots$,
- ▶ *kvantifikatorja* \forall in \exists ter
- ▶ oklepaja (in) .

Spremenljivkam in konstantam pravimo tudi *termi*.

Atomi predikatnega računa so, na primer,

$$P(x), P(a), Q(x, y), Q(a, x), \dots$$

Atome dobimo tako, da terme vstavimo v predikate.

Izjavne formule

Izjavne formule so definirane induktivno:

1. Atomi so izjavne formule
2. Če sta W in V izjavni formuli in je x spremenljivka, potem so tudi

$$(\neg W), (W \wedge V), (W \vee V), (W \Rightarrow V), (W \Leftrightarrow V), \dots$$

$$(\exists x W) \quad \text{in} \quad (\forall x W)$$

izjavne formule.

Doseg kvantifikatorjev

Doseg kvantifikatorja je *najmanjši možen*: najmanjša izjavna formula, ki jo preberemo desno od kvantifikatorja (skupaj z njegovo spremenljivko).

Kvantifikator *veže* svojo spremenljivko in proste spremenljivke z istim imenom v svojem dosegu.

Formulo brez prostih spremenljivk imenujemo, če imamo izbrano interpretacijo, *izjava*, ali *izjavna shema*, če interpretacija ni določena.

Doseg, vezane in proste spremenljivke

Določi doseg kvantifikatorjev in odloči, katere spremenljivke so vezane in katere proste:

$$\forall x \neg \exists x \forall z P(x, y, z)$$

$$\exists x \neg P(x, y) \Rightarrow Q(x) \wedge R(y)$$

$$\exists x P(x) \Rightarrow \forall x Q(x) \vee P(x) \wedge R(x) \vee S(y)$$

Interpretacija izjavne formule

Interpretacija \mathcal{I} izjavne formule W je sestavljena iz neprazne množice \mathcal{D} , ki ji pravimo *področje pogovora* interpretacije.

Poleg tega

- ▶ vsakemu predikatu ustreza 0/1 logična funkcija v \mathcal{D} (0-mestnemu predikatu ustreza izjava oziroma njena logična vrednost)
- ▶ vsaki konstanti določimo vrednost v \mathcal{D} (ponavadi je implicitno določena že z imenom konstante)
- ▶ vsaki prosti spremenljivki v W določimo vrednost v \mathcal{D} , pri tem vsem prostim spremenljivkam z istim imenom določimo *isto* vrednost iz \mathcal{D} .

Pomen kvantifikatorjev

Naj bo W formula. Z $W(x/a)$ označimo formulo, ki jo dobimo tako, da v formuli W vse proste vstope spremenljivke x nadomestimo z a .

$$W \qquad P(x) \vee \exists x Q(x, y) \wedge R(b, x)$$

$$W(x/a) \qquad P(a) \vee \exists x Q(x, y) \wedge R(b, a)$$

Pomen kvantifikatorjev

Formula $\forall x W$ je *resnična* v interpretaciji \mathcal{I} , če je za vsak element področja pogovora $d \in \mathcal{D}$ resnična formula $W(x/d)$. Sicer je $\forall x W$ neresnična.

Formula $\exists x W$ je *resnična* v interpretaciji \mathcal{I} , če v področju pogovora obstaja $d \in \mathcal{D}$, za katerega je formula $W(x/d)$ resnična. Sicer je $\exists x W$ neresnična.

Enakovredne izjavne formule

Izjavni formuli W in V sta *enakovredni*, če imata isto logično vrednost v vseh možnih interpretacijah.

V tem primeru pišemo $W \sim V$.

Enakovredne izjavne formule

Izjavna formula W je *splošno veljavna*, če je resnična v vsaki interpretaciji.

Izjavna formula V je *neizpolnljiva*, če je neresnična v vsaki interpretaciji.

Zgled

Formuli $\neg\forall x W$ in $\exists x \neg W$ sta enakovredni.

Zakoni predikatnega računa

So nekateri pomembni pari enakovrednih izjavnih formul:

$$\neg \forall x W \sim \exists x \neg W$$

$$\neg \exists x W \sim \forall x \neg W$$

$$\forall x \forall y W \sim \forall y \forall x W$$

$$\exists x \exists y W \sim \exists y \exists x W$$

$$\forall x (W \wedge V) \sim \forall x W \wedge \forall x V$$

$$\exists x (W \vee V) \sim \exists x W \vee \exists x V$$

Preimenovanje spremenljivk

Formula

$$\forall x (P(w) \Rightarrow P(x))$$

je enakovredna formuli

$$\forall y (P(w) \Rightarrow P(y))$$

in **ni** enakovredna formuli

$$\forall w (P(w) \Rightarrow P(w)).$$

Preimenovanje spremenljivk

Trditev

Če se y ne pojavi v W , potem veljata enakovrednosti:

$$\forall x W \quad \sim \quad \forall y (W(x/y))$$

$$\exists x W \quad \sim \quad \exists y (W(x/y))$$

Preimenovanje spremenljivk

Želja: če je W formula, potem imen prostih spremenljivk ne smemo spreminjati, če želimo pridelati enakovredno formulo. Vezane spremenljivke lahko preimenujemo tako, da ista spremenljivka (tj. spremenljivka z istim imenom)

- ▶ *ne nastopa pri več kvantifikatorjih*
- ▶ *ni hkrati vezana in prosta.*

Zakoni predikatnega računa z omejitvami

Če se x ne pojavi (prosto) v formuli C , potem veljajo naslednje enakovrednosti:

$$\forall x (C \vee W) \sim C \vee \forall x W$$

$$\exists x (C \vee W) \sim C \vee \exists x W$$

$$\forall x (C \wedge W) \sim C \wedge \forall x W$$

$$\exists x (C \wedge W) \sim C \wedge \exists x W$$

Preneksna normalna oblika

Naj bo W izjavna formula. *Preneksna normalna oblika* izjavne formule W je izjavna formula W_{PNO} , za katero velja:

- ▶ W_{PNO} je enakovredna W in
- ▶ W_{PNO} ima vse kvantifikatorje na začetku.

Izrek

Vsaka izjavna formula W ima preneksno normalno obliko.

Preneksna normalna oblika

Kako do preneksne normalne oblike?

1. Preimenuj vezane spremenljivke v formuli tako, da nobena dva kvantifikatorja ne uporabljata spremenljivke z istim imenom in so imena prostih spremenljivk drugačna od imen vezanih spremenljivk.
2. Premakni kvantifikatorje proti levi, pri tem pa, če je potrebno, nadomesti \Rightarrow in \Leftrightarrow z logičnimi vezniki \neg, \wedge, \vee .

Preneksna normalna oblika

$$\forall x A(x) \vee \exists x B(x) \Rightarrow D(x) \wedge \exists x D(x)$$

